

PREPARACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE: EGD BRAVO

BRAVO es una prueba inalámbrica sin catéter que mide los niveles de ácido en el esófago para ayudar a diagnosticar la ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico). Durante una EGD (endoscopia superior), se conecta temporalmente al esófago una pequeña cápsula de registro y transmite los datos a un pequeño receptor externo que se usa durante 48 a 96 horas. La cápsula se cae naturalmente y pasa a través de su sistema digestivo, eliminando la necesidad de extraerla.

Informe a su proveedor si tiene alguno de los siguientes síntomas: marcapasos cardíaco, desfibrilador implantado, unidad TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) o cualquier otro dispositivo electromédico implantado/externo.

7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ **DEJE** de tomar los siguientes medicamentos:
 - Aciphex, Nexium, Prilosec, Prevacid, Protonix, Dexilant
- ✓ **SIGA** tomando lo siguiente:
 - Medicamentos recetados habituales, salvo que el personal del consultorio u otro proveedor le indique suspenderlos.

Asegúrese de coordinar transporte médico o de que un adulto responsable lo lleve el día del procedimiento. Por su seguridad, **NO** se le permitirá conducir, operar maquinaria ni regresar al trabajo hasta el día siguiente. Su conductor debe permanecer en el lugar durante toda la visita.

3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ **DEJE** de tomar los siguientes medicamentos:
 - Zantac, Tagamet, Pepcid, Axid

1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ **RESTRICCIONES:**
 - **NO** consuma alcohol, sustitutos de crema ni líquidos de color rojo o morado.
 - Medicamentos: TUMS, Mylanta, Maalox
- ✓ **ALIMENTACIÓN:**
 - Hasta las 11:45 p.m., puede consumir su alimentación habitual.
 - Después de las 11:45 p. m., solo puede consumir líquidos claros hasta **4 horas** antes de su procedimiento.
 - Por ejemplo: agua, caldo de pollo, jugo de manzana o uva blanca, bebidas deportivas, paletas heladas, gelatina, café y té (sin crema), y refrescos.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

✓ 4 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- **NO BEBA NINGÚN LÍQUIDO NI CONSUMA NADA POR VÍA ORAL** debido al riesgo de aspiración. Si no cumple con estas indicaciones, el procedimiento se retrasará o cancelará.

PREPARACIÓN PARA LA LLEGADA

- ✓ Deje sus objetos de valor (incluidos relojes, joyas y demás pertenencias) en casa.
- ✓ Recuerde traer su identificación con foto, tarjeta de seguro y lista de medicamentos actualizada.

AJUSTES EN LOS MEDICAMENTOS

- ✓ **Para pacientes con diabetes:**
 - Recuerde controlar sus niveles de azúcar en la sangre el día anterior y el día del procedimiento.
- ✓ **Para pacientes que toman anticoagulantes:**
 - Si está tomando anticoagulantes como Warfarina, Plavix, Eliquis o Xarelto, asegúrese de seguir las instrucciones específicas que le haya dado el personal del consultorio.
- ✓ **Para pacientes que toman medicamentos GLP-1:**
 - Por ejemplo: Ozempic, Wegovy, Zepbound, Trulicity, Bydureon, Byetta, Saxenda, Victoza, Adlyxin y Rybelsus.
 - **Si toma su medicamento GLP-1 a diario:** no lo tome el día del procedimiento.
 - **Si toma su medicamento GLP-1 semanalmente:** no lo tome durante los 7 días previos al procedimiento.

¿Necesita más ayuda?

- Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, llame a nuestro consultorio durante el horario de atención habitual de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al 208-489-1887.
- Si necesita comunicarse después de las 5:00 p.m., llame al 208-489-1900.

Preguntas frecuentes

- Para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web: www.digestivehealthclinic.com
- Recuerde presentarse en el hospital para su procedimiento.