

PREPARACIÓN PARA LA CÁPSULA DE PERMEABILIDAD

Una cápsula de permeabilidad es una píldora soluble diseñada para evaluar la permeabilidad (apertura) del sistema digestivo, especialmente del intestino delgado. La cápsula recorre el tracto digestivo para determinar si existen obstrucciones o estrechamientos que podrían causar complicaciones en una futura endoscopia con cápsula de video.

1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ **DESAYUNO**
 - Puede desayunar con normalidad.
- ✓ **ALMUERZO**
 - Puede comer un almuerzo ligero (por ejemplo, sopa o sándwich). Después del almuerzo, solo puede consumir una dieta de líquidos transparentes hasta las 10:00 p.m.
 - Por ejemplo: agua, caldo de pollo, jugo de manzana o uva blanca, bebidas deportivas, paletas heladas, gelatina, café y té (sin crema), y refrescos.
 - **NO** consuma alcohol, crema, líquidos rojos o morados
- ✓ Después de las **10:00 p.m.:** **NO BEBA LÍQUIDOS NI CONSUMA NADA POR VÍA ORAL**

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ **NO BEBA LÍQUIDOS NI CONSUMA NADA POR VÍA ORAL.** Si no cumple con estas indicaciones, su cita se retrasará o cancelará.

PREPARACIÓN PARA LA LLEGADA

- ✓ Complete la documentación de admisión electrónica que se le envió por mensaje de texto o correo electrónico. Se brindará asistencia o adaptaciones si lo solicita.
- ✓ Deje sus objetos de valor (incluidos relojes, joyas y demás pertenencias) en casa. No nos hacemos responsables de estos artículos.
- ✓ Recuerde traer su identificación con foto, tarjeta de seguro y lista de medicamentos actualizada.
- ✓ No traiga niños, ya que no podemos brindar adaptaciones para su cuidado y comodidad.

AJUSTES EN LOS MEDICAMENTOS

- ✓ **Para pacientes con diabetes:**
 - Recuerde controlar sus niveles de azúcar en la sangre el día anterior y el día del procedimiento.
- ✓ **Para pacientes que toman anticoagulantes:**
 - Si está tomando anticoagulantes como Warfarina, Plavix, Eliquis o Xarelto, asegúrese de seguir las instrucciones específicas que le haya dado el personal del consultorio.
- ✓ **Para pacientes que toman medicamentos GLP-1:**
 - Por ejemplo: Ozempic, Wegovy, Zepbound, Trulicity, Bydureon, Byetta, Saxenda, Victoza, Adlyxin y Rybelsus.
 - **Si toma su medicamento GLP-1 a diario:** no lo tome el día del procedimiento.
 - **Si toma su medicamento GLP-1 semanalmente:** no lo tome durante los 7 días previos al procedimiento.

¿Necesita más ayuda?

- Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, llame a nuestro consultorio durante el horario de atención habitual de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al 208-489-1887.
- Si necesita comunicarse después de las 5:00 p.m., llame al 208-489-1900.

Preguntas frecuentes

- Para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web:
www.digestivehealthclinic.com