

PREPARACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE: ESTUDIO PH/BRAVO

Esta hoja de instrucciones abarca varios tipos de procedimientos diferentes, un miembro de nuestra oficina confirmará para cuál de los siguientes procedimientos está programado

El estudio de pH mide la acidez del esófago. Se introduce un tubo delgado y flexible en el esófago a través de la nariz o la boca. La sonda mide los niveles de pH en el esófago durante un período de 24 horas

BRAVO es una prueba inalámbrica sin catéter que mide los niveles de ácido en el esófago para ayudar a diagnosticar la ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico). Durante una EGD (endoscopia superior), se conecta temporalmente al esófago una pequeña cápsula de registro y transmite los datos a un pequeño receptor externo que se usa durante 48 a 96 horas. La cápsula se cae naturalmente y pasa a través de su sistema digestivo, eliminando la necesidad de extraerla.

Consideración especial: No se recomienda realizarse estas pruebas si tiene un marcapasos cardíaco, un desfibrilador de marcapasos, una unidad TENS u otro dispositivo electromédico.

7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ DEJE de tomar los siguientes medicamentos:
 - Aciphex, Nexium, Prilosec, Prevacid, Protonix, Dexilant
- ✓ SIGA tomando lo siguiente:
 - Medicamentos recetados habituales, salvo que el personal del consultorio u otro proveedor le indique suspenderlos.

3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ DEJE de tomar los siguientes medicamentos:
 - Zantac, Tagamet, Pepcid, Axid

1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- ✓ **RESTRICCIONES:**
 - **NO** consuma alcohol, sustitutos de crema ni líquidos de color rojo o morado.
 - Medicamentos: TUMS, Mylanta, Maalox
- ✓ **ALIMENTACIÓN:**
 - Hasta las 11:45 p.m., puede consumir su alimentación habitual.
 - Después de las 11:45 p. m., solo puede consumir líquidos claros hasta **4 horas** antes de su procedimiento.
 - Por ejemplo: agua, caldo de pollo, jugo de manzana o uva blanca, bebidas deportivas, paletas heladas, gelatina, café y té (sin crema), y refrescos.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

✓ 4 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- **NO BEBA NINGÚN LÍQUIDO NI CONSUMA NADA POR VÍA ORAL** debido al riesgo de aspiración. Si no cumple con estas indicaciones, el procedimiento se retrasará o cancelará.

PREPARACIÓN PARA LA LLEGADA

- ✓ Deje sus objetos de valor (incluidos relojes, joyas y demás pertenencias) en casa.
- ✓ Recuerde traer su identificación con foto, tarjeta de seguro y lista de medicamentos actualizada.

AJUSTES EN LOS MEDICAMENTOS

- ✓ **Para pacientes con diabetes:**
 - Recuerde controlar sus niveles de azúcar en la sangre el día anterior y el día del procedimiento.
- ✓ **Para pacientes que toman anticoagulantes:**
 - Si está tomando anticoagulantes como Warfarina, Plavix, Eliquis o Xarelto, asegúrese de seguir las instrucciones específicas que le haya dado el personal del consultorio.
- ✓ **Para pacientes que toman medicamentos GLP-1:**
 - Por ejemplo: Ozempic, Wegovy, Zepbound, Trulicity, Bydureon, Byetta, Saxenda, Victoza, Adlyxin y Rybelsus.
 - **Si toma su medicamento GLP-1 a diario:** no lo tome el día del procedimiento.
 - **Si toma su medicamento GLP-1 semanalmente:** no lo tome durante los 7 días previos al procedimiento.

¿Necesita más ayuda?

- Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, llame a nuestro consultorio durante el horario de atención habitual de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al 208-489-1887.
- Si necesita comunicarse después de las 5:00 p.m., llame al 208-489-1900.

Preguntas frecuentes

- Para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web: www.digestivehealthclinic.com
- Recuerde presentarse en el hospital para su procedimiento.